

**SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA
IN MERITO AGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA
EROGATI DELL'A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI**

L'A.S.L. Napoli 1 Centro, in accordo con il Comune di Napoli, eroga un Programma di interventi territoriali di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione.

Il servizio è affidato in outsourcing ad Operatori Economici qualificati nel settore del Pest Control Urbano che agiscono sotto la costante supervisione sanitaria dell'ASL.

INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

Il ciclo di disinfestazione adulticida territoriale è rivolto alla riduzione della popolazione di insetti adulti come zanzare, ma è attivo anche nel contenere moscerini, mosche e altri ditteri, mediante nebulizzazione a basso volume (ULV) su strade, esterno dei parchi, esterno delle aree verdi pubbliche e pertinenze delle reti di scolo superficiali.

I prodotti impiegati sono piretroidi sintetici a basso impatto ambientale autorizzati dal Ministero della Salute, a bassa persistenza ambientale e a rapida degradazione. Il trattamento viene effettuato esclusivamente in orario notturno, dalle 23:00 alle 5:00, quando le condizioni meteorologiche e atmosferiche sono più favorevoli alla dispersione uniforme del prodotto e la presenza di persone in strada è ridotta al minimo.

I piretroidi utilizzati si degradano rapidamente a contatto con luce solare e aria. Tuttavia, nelle ore immediatamente successive al trattamento notturno, è consigliabile ridurre l'esposizione diretta e seguire le indicazioni di seguito riportate, in particolare per le categorie più sensibili: bambini, anziani, donne in gravidanza, persone con allergie respiratorie.

- ✓ **Ritira biancheria e oggetti dai balconi e terrazzi.** Porta all'interno i giochi dei bambini, gli attrezzi da giardinaggio, i cuscini e qualsiasi tessile esposto su terrazzi e balconi prima dell'inizio del trattamento notturno. In caso di dimenticanza, ventila e sciacqua con acqua gli oggetti rimasti all'esterno prima di riportarli dentro o di farne uso il giorno successivo.
- ✓ **Copri o ritira alimenti, stoviglie e bevande all'aperto.** Se hai tavoli da giardino, barbecue, cucine esterne o ripiani sui terrazzi con alimenti o stoviglie, copri con teli o ritirali all'interno. Anche se i piretroidi si degradano rapidamente, è buona norma igienica evitare il contatto diretto del prodotto con superfici alimentari o contenitori da cucina. La mattina successiva, sciacqua con acqua corrente i piani d'appoggio esposti all'aperto.
- ✓ **Proteggi gli animali domestici e le voliere all'esterno.** Porta all'interno cani, gatti, conigli, volatili in gabbia e altri animali domestici che stazionano normalmente su terrazzi, cortili o giardini. Le voliere e le gabbie esterne devono essere coperte con teli o spostate al riparo prima dell'inizio del trattamento. Gli acquari all'aperto o le vasche con pesci devono essere coperti, poiché i piretroidi sono altamente tossici per i pesci e gli organismi acquatici.
- ✓ **Non sostare all'aperto durante le operazioni di nebulizzazione.** Se ti trovi all'esterno nelle ore di trattamento e incontri i mezzi operativi in azione, allontanati rapidamente dalla zona di nebulizzazione. Non correre, cammina in direzione perpendicolare al vento e al fronte di nebulizzazione. In caso di contatto accidentale con il prodotto, lava le parti esposte (*pelle, occhi*) abbondantemente con acqua corrente. Per eventuali disturbi respiratori, consulta un medico.
- ✓ **Lascia libera la carreggiata per i mezzi operativi.** I veicoli attrezzati per la nebulizzazione hanno necessità di percorrere le strade a velocità ridotta e in modo continuativo. Non parcheggiare in doppia fila o in posizioni che rendano difficoltoso il transito dei mezzi operativi. Eventuali auto mal parcheggiate costringono gli operatori a deviare il percorso, lasciando zone del territorio parzialmente non trattate.
- ✓ **Riduci le condizioni che favoriscono la proliferazione degli insetti.** Il trattamento adulticida è efficace ma temporaneo: elimina gli adulti presenti ma non agisce sulle larve. Per ridurre la ripopolazione, elimina i ristagni d'acqua nei sottovasi, bidoni, pneumatici abbandonati e cavità nelle aree verdi. Taglia l'erba alta nei cortili. Installa zanzariere a porte e finestre.

Queste misure di prevenzione ambientale potenziano e prolungano l'efficacia del trattamento pubblico. Collabora attivamente per garantire la massima efficacia degli interventi!